

FIELD CROP

Publication No. 100A
Agdex No. 100.32

GUIDE TO VARIETY AND PESTICIDE SELECTION



1990

FOR THE ATLANTIC PROVINCES

Prepared by the
ADVISORY COMMITTEES ON
CEREAL, PROTEIN, CORN
AND FORAGE CROPS.

Published by authority of the
ATLANTIC PROVINCES AGRICULTURE
SERVICES CO-ORDINATING
COMMITTEE



For additional information regarding field crop production, refer to Publication 100, FIELD CROP GUIDE.

RECOMMENDED FORAGE CROP VARIETIES

LEGUMES

Note: Verticillium wilt has been identified within the region. If this disease is a problem in your area, consult your local Crop Specialist or Agricultural Representative before selecting an alfalfa variety.

FLEMISH ALFALFA	Approximate* Flowering Date	Yield (% of Saranac)	Winter Hardiness	Reaction to** Verticillium wilt
Apica	June 15	102%	Very Good	S
Anchor	June 15	100	Good	S
Angus	June 15	100	Good	S
Citation	June 15	98	Good	S
Pacer	June 15	88	Good	S
Saranac	June 15	100	Good	S
Thor	June 15	100	Good	S
532	June 15	100	Good	S

AVERAGE YIELD OF SARANAC IN ATLANTIC TRIALS WAS 8.8 t/ha

STANDARD ALFALFA	Approximate* Flowering Date	Yield (% of Iroquois)	Winter Hardiness	Reaction to** Verticillium wilt
Algonquin	June 20	102	Very Good	S
Blazer	June 20	100	Good	S
Iroquois	June 20	100	Good	S
120	June 20	102	Good	S

AVERAGE YIELD OF IROQUOIS IN ATLANTIC TRIALS WAS 8.6 t/ha

RED CLOVER	Approximate* Flowering Date	Yield (% of Florex)	Winter Hardiness
		1st Cut	2nd Cut

DOUBLE-CUT

Marino	June 23	106	112	Very Good
Jubilatka	June 23	101	107	Good
Tapiopoly	June 23	92	106	Good
Tristan	June 23	84	97	Good
Prosper I	June 23	91	98	Good
Violetta R.V.P.	June 23	93	101	Good
Hungaropoly	June 23	92	104	Good
Arlington	June 25	90	99	Good
Lakeland	June 25	91	110	Good
Florex	June 27	100	100	Good

SINGLE-CUT

Altaswede	July 20	116	—	Good
-----------	---------	-----	---	------

AVERAGE YIELD OF FLOREX IN ATLANTIC TRIALS WAS 4.4 t/ha FOR 1st CUT; AND 2.8 t/ha FOR 2nd CUT.

BIRDSFOOT TREFOIL	Approximate* Flowering Date	Regrowth	Winter Hardiness
Viking	June 20	Good	Good
Leo	June 25	Good	Very Good
Empire	July 2	Slow	Very Good

WHITE CLOVER(LADINO)

Sacramento	June 26	Good	Good
Sonja	June 26	Excellent	Very Good

PERENNIAL GRASSES

TIMOTHY	Heading* Date	YIELD (% of Champ)	
		1st Cut	2nd Cut
Salvo	June 18	91	92
Clair	June 20	90	96
Toro	June 20	100	91
Basho	June 20	97	90
Richmond	June 23	100	93
Champ	June 25	100	100
Itasca	June 27	108	73
Timfor	June 27	112	85
Climax	June 29	116	74
Drummond	July 2	114	57
Farol	July 9	129	74

AVERAGE YIELD OF CHAMP IN ATLANTIC TRIALS WAS 5.5 t/ha FOR 1st CUT; AND 3.2 t/ha FOR 2nd CUT.

BROMEGRASS	Heading* Date	Regrowth	Tolerance to Variable Drainage
Saratoga	June 15	Good	Fair
Tempo	June 15	Good	Fair

ORCHARDGRASS

Frode	June 12	Excellent	Poor
Kay	June 16	Excellent	Poor

MEADOW

Mimer	June 19	Good	Good
Trader	June 19	Good	Good

TALL FESCUE HYBRIDS

Kenhy	June 17	Good	Good
Johnstone	June 17	Good	Good

REED CANARYGRASS

Palaton*	June 13	Good	Excellent
Vanture*	June 13	Good	Excellent
Vantage	June 14	Good	Excellent

*Low alkaloid varieties

PERENNIAL RYEGRASS

Norlea	July 2	Excellent	Fair
--------	--------	-----------	------

*HEADING OR FLOWERING DATE MAY VARY WITHIN THE REGION AND FROM YEAR TO YEAR. OPTIMUM HARVEST DATE FOR QUALITY MAY BE EARLIER.

**S - DESIGNATION FOR REACTION TO VERTICILLIUM WILT DENOTES SUSCEPTIBLE VARIETY.

OTHER CROPS MAY BE USED FOR SUPPLEMENTARY FORAGE, SEE PUBLICATION 100.

ANNUAL FORAGES

ANNUAL RYEGRASS	Type	Yield (% of Lental)	Use
Aubade	Tetraploid Westerwolds	119	Hay-Haylage-Pasture
Marshall	Diploid Westerwolds	120	Hay-Haylage-Pasture
Barapetra	Tetraploid Westerwolds	111	Haylage-Pasture
Promenade	Tetraploid Westerwolds	104	Haylage-Pasture
Maris Ledger	Tetraploid Italian	104	Pasture
Lental	Diploid Italian	100	Pasture
Bartolini	Diploid Italian	99	Pasture
Barmultra	Tetraploid Italian	97	Pasture

AVERAGE YIELD OF LENTAL IN ATLANTIC TRIALS WAS 8.7 t/ha.

FORAGE KALE	Height (cm)	Yield (% of Maris Kestrel)	Frost Hardiness
Grüner Angeliter	120	112	Good
Maris Kestrel	80	100	Very Good
FORAGE RAPE			
Barcoli	70	72	Fair

AVERAGE YIELD OF MARIS KESTREL IN ATLANTIC TRIALS WAS 9.5 t/ha.

HERBICIDE TREATMENT/TIMING The herbicides below are listed by chemical name, example trade names are provided.	WEEDS ¹															
	Bedstraw (P)	Buttercup (P)	Campion, bladder (P)	Chickweed (A)	Cockle, white (P)	Daisy, ox-eye (P)	Dandelion (P)	Goldenrod (P)	Hempnettle (A)	Lady's Thumb (A)	Lambs-quarters (A)	Mayweed (A)	Mustards (A)	Pigweed (A)	Pineappleweed (A)	Plantains (P)
PREPLANT APPLICATION Glyosate (Round-up) Fall Applications are best	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
EPTC (Eptam) Alfalfa or trefoil purestands only				*							*			*		
Trifluralin (Treflan) Alfalfa purestands only				*							*			*		
NEWLY SEEDED LEGUMES AND LEGUME/GRASS MIXTURES 2, 4-DB (Embutox 625, Cobutox)							*	*		*	*			*	*	*
2, 4-DB + MCPA (Alfalfa damage may occur)		*					*	*		*	*		*	*	*	*
MCPB/MCPA (Tropotox Plus)		*					*	*		*	*		*	*	*	*
NEWLY SEEDED AND ESTABLISHED GRASS STANDS 2,4-D						*	*	*		*	*		*	*	*	*
MCPA	*	*			*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*
Dicamba (Banvel)				*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*

NOTE: Herbicides are only one method of weed control. For assistance in planning a weed control program consult Publication 100, **Field Crop Guide** and Publication 75, **Guide to Weed Control**.

NOTE: For further information on rates of application of these and other herbicides consult Pub. 75.

PLANT CLASSIFICATION

- (A) Annual
- (WA) Winter Annual
- (B) Biennial
- (P) Perennial

HERBICIDE RESPONSE

Response in many cases is affected by growth stage of the weed. **READ THE LABEL**

FORAGE INSECT CONTROL

Insect	Treatment
European Skipper	Dipel W.P. Thuricide HPC

**Keep Herbicides
in Original Containers
and
READ THE LABEL**

RECOMMENDED CORN HYBRIDS

GRAIN PRODUCTION

Hybrids with an* are NEW recommendations for this year.

Zone	Hybrid	Canadian Supplier ¹	Type of Hybrid ²	Total Years X Sites Tested	Stalk Breakage (%)	Emerge. ³ Rate (%)	Grain* Moisture Content (%)	Yield* at 15.5% Moisture (t/ha)
All Hybrids Suitable for Zone 1 Zone 2	G-4017 (CG)	2	3W	19	16	92	26.7	5.8
	K610 (Pride)	10	3W	33	13	92	28.6	5.4
	Co-op 2335	3	SC	14	24	88	28.8	5.7
	DK-235 (Dekalb)*	4	OC	14	13	93	29.1	6.0
	Co-op 2325	3	SC	19	13	87	29.9	6.2
	3979 (Pioneer)	9	SC	14	14	93	30.3	6.3
	PX 9028 (NK)	7	3W	15	12	82	30.5	5.3
	Pickseed 2477	8	3W	15	12	92	30.8	5.9
	Co-op 6312*	3	3W	12	20	89	31.0	5.5
	G-4083 (CG)	2	SC	41	14	90	31.4	5.4
	Pickseed 2555	8	SC	38	14	82	31.6	6.3
	Pickseed 2555A	8	MS	37	15	88	33.0	6.0
	Hyland HL2219	5	SC	37	15	78	35.7	6.2
	Co-op S259	3	SC	41	14	80	36.1	6.2
	T778 (Dekalb)	4	OC	41	14	86	36.4	6.2

1 Refer to table of suppliers for complete names and addresses.

2 SC = single cross; MS = modified single cross; 3W = 3 way cross; OC = other.

3 Emergence rate was determined at the 5 leaf stage, PRIOR TO THINNING to a constant plant stand in each plot. Data are averages of the last 4 years only.

4 Data are averages for all Atlantic trials over at least 2 years, with up to a 6 trial-locations per year. The table values (above) indicate a hybrid's performance when grown in **Zone 2**. To estimate a hybrid's performance in **Zone 1**, add 0.8 t/ha to the yield, and subtract 3.3% from the at-harvest grain moisture content above. For Performance in **Zone 3**, subtract 0.6 t/ha from the yield and add 5.8% to the at-harvest grain moisture content.

SILAGE PRODUCTION

Hybrids with an* are NEW recommendations this year.

Zone	Hybrid	Supplier ¹	Type of Hybrid ²	Total Years X Sites Tested	Emergence ³ rate (%)	WHOLE PLANT ⁴	
						DM Content (%)	DM Yield (t/ha)
All Hybrids Suitable for Zone 1 Zone 2	Pickseed 2444	8	MS	24	88	30.0	10.9
	DK-291 (Dekalb)	4	MS	15	92	29.4	10.8
	G-4017 (CG)	2	3W	26	91	29.3	10.7
	3979 (Pioneer)	9	SC	22	93	29.2	10.4
	Co-op 6312*	3	3W	15	89	29.1	10.5
	K730 (Pride)	10	3W	28	90	29.1	9.7
	Pickseed 2555A	8	MS	37	88	28.9	11.3
	G-4083 (CG)	2	SC	43	90	28.5	9.8
	PX 9028 (NK)	7	3W	22	85	27.6	10.8
	PX 9060 (NK)	7	SC	24	91	27.6	10.7
	Bishop 30-30	1	SC	41	86	27.3	11.1
	Co-op S259	3	SC	43	78	27.1	11.6
	3957 (Pioneer)	9	SC	43	88	27.0	11.0


1 Refer to table of suppliers for complete names and addresses.

2 SC = single cross; MS = modified single cross; 3W = 3 way cross.

3 Emergence rate was determined at 5 leaf stage, PRIOR TO THINNING to a constant stand in each plot. Data are averages of last 4 years only.

4 Data are averages for all Atlantic trials over at least 2 years, with up to 7 trial-locations per year. The table values (above) indicate a hybrid's performance when grown in **Zone 2**. To estimate a hybrid's performance in **Zone 1**, add 0.7 t/ha to the yield, and add 1.8% to the dry matter content. For Performance in **Zone 3**, subtract 0.1 t/ha from the yield, and subtract 2.1% from the dry matter content.

ZONES FOR CORN PRODUCTION



MAP PREPARED WITH ASSISTANCE OF THE ATLANTIC
COMMITTEE ON AGROMETEROLOGY

FOR SOYBEANS ON PRINCE EDWARD ISLAND

Zone 2 for Corn = Zone 1 for Soybeans
Zone 3 for Corn = Zone 2 for Soybeans
FOR PRINCE EDWARD ISLAND ONLY

The Maritime Provinces have been divided into four
zones for corn production.

ZONE 1: Greatest potential for corn production as either silage or grain exists in this zone. Planting hybrids with different maturity can spread out the harvest period.

ZONE 2: Early hybrids are required for good silage maturity. The earliest grain hybrids will produce acceptable high moisture ear corn and high moisture grain.

ZONE 3: Only the earliest hybrids will produce acceptable silage in this zone. High moisture ear corn or high moisture grain production is possible with the very earliest hybrids most years.

ZONE 4: Corn production is very risky and corn will usually freeze before becoming sufficiently mature for acceptable silage.

CANADIAN SEED CORN SUPPLIERS

HYBRID IDENT.

BISHOP
CG
CO-OP
DEKALB
HYLAND
MINAS
NK
PICKSEED
PIONEER
PRIDE

CANADIAN SUPPLIER

1. Bishop Seeds Ltd.
2. Ciba-Geigy Canada Ltd.
3. United Cooperatives of Ontario
4. Dekalb Canada Inc.
5. W.G. Thompson & Sons Ltd.
6. Minas Seed Co-operative Ltd.
7. Northrup King Seeds Ltd.
8. Otto Pick & Sons Seeds Ltd.
9. Pioneer Hi-Bred Ltd.
10. King Agro Inc.

ADDRESS

Box 338, Belleville, Ontario K8N 3L1
RR# 3 Cottam, Ontario N0R 1B0
Box 1239, Chatham, Ontario N7M 5R9
RR# 2, Glanworth, Ontario N0L 1L0
Box 130, Blenheim, Ontario N0P 1A0
Box 130, Canning, N.S. B0P 1H0
Box 1207, Cambridge, Ontario N1R 6C9
Box 126, Richmond Hill, Ontario L4C 4X9
Box 730, Chatham, Ontario N7M 5L1
Box 1088, Chatham, Ontario N7M 5L6

CORN HERBICIDE WEED CONTROL RATINGS

Herbicides are not the only method of weed control. Field and machinery sanitation, crop rotations, cultivation, and clipping should be considered in a weed control program. See Publication 100, FIELD CROP GUIDE for assistance in planning a weed control program.

Publication 75. *Using a random number generator to help in the selection of a random sample from a population is an example of a random sampling method.*

The chemical ratings in this chart give general comparisons for use as described in the guide. Under unfavourable conditions (e.g. too dry, too wet, too cold or poor application) the herbicides may not be as effective as indicated.

[illegible]

CORN INSECT CONTROL

Insect	Treatment
Seed Maggots	Diazinon-lindane Diazinon-lindane-capitan Courter 15G
European Corn Borer	Ambush 500EC Cybush 250EC Furadan 480F Sevin
Wireworms	Diazinon-Lindane Courter 15G

Insect	Treatment
Armyworms	Sevin Dylox
Cutworms	Ambush Dylox Lorsdan 4 E Sevin 50 WP Rippcord 400 EC





RECOMMENDED CEREAL GRAIN VARIETIES

(For varieties to be considered for registration & recommendation they must have at least 9 station years testings)

RECOMMENDATION STATUS ¹	YIELD POTENTIAL ²	LODGING RESISTANCE	MATURITY ⁴	Powdery Mildew ⁷	Septoria ⁷	Scald ⁷	Net/Spot Blotch ⁷	Fusarium head blight ⁷
---------------------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------

BARLEY	DESCRIPTION		% Leger		Days from May 31 5 6			Disease ratings ⁷ (1-9)	
ALBANY	— 2 row-rough awned; fair straw strength	FR	97	Fair	96	1	—	5 7	2
CADETTE	— 6 row-smooth awned; Semi-dwarf; strong strawed	FR	98	V. Good	99	3	—	7 6	2
CHAPAIS	— 6 row-rough awned; Strong straw strength	PR	109	Good	95	2	—	6 6	2
HELENA	— 2 row-rough awned; Strong strawed	PR	99	Good	95	1	—	5 7	2
LEGER	— 6 row-smooth awned; Tall; strong strawed	FR	100	Good	96	2	—	6 5	3
MICMAC	— 2 row-rough awned; Fair straw strength	FR	92	Fair	95	1	—	5 7	2
RODEO	— 2 row-rough awned; Short; strong strawed	FR	97	Good	96	1	—	5 7	2

OATS			% of SENTINEL						% Hull
BALDWIN	— High yield	PR	103	Good	105	—	7	—	4 25
CAPITAL	— High yield; low % hull; high groat yield	PR	109	Good	104	—	7	—	3 25
MARION	— Early maturity; low % hull; high groat yield	FR	107	Good	100	—	5	—	4 24
NOVA	— High yield; low % hull	FR	109	Good	103	—	7	—	4 24
SENTINEL	— Tolerant to late season stem break; Excellent straw strength	FR	100	V. Good	105	—	4	—	2 28
SHAW	— Moderately tolerant to late season stem break; Low % hull	FR	104	Good	103	—	7	—	3 24
TIBOR	— A hullless variety; High % protein	FR	74	V. Good	105	—	7	—	6 3

SPRING TRITICALE			% of Milton						
BEAGUELITA	— Feed quality; late maturity	FR	110	V. Good	114	—	6	—	7

SPRING WHEAT			% of Milton						
BELVEDERE	— Feed quality;	FR	106	Good	110	2	7	—	4
MAX	— Milling quality	FR	100	Good	112	7	7	—	6
MILTON ³	— Feed quality; awned	OC	100	Good	112	2	7	—	4
KATEPWA	— Milling quality; Recommended for P.E.I. only	PR	75	Good	108	7	7	—	3

WINTER WHEAT			% of Borden 5 6						
ABSOLVENT	— Milling quality; Good winterhardness	FR	100 90	Good	62 68	8	6	—	3
BORDEN	— Feed quality; V. Good winterhardness	FR	100 100	Fair	62 68	5	6	—	3
MONOPOL	— Milling quality; Fair winterhardness; Best suited to Annapolis Valley and similar climatic zones	FR	100 85	Good	66 73	7	6	—	3

WINTER RYE	DESCRIPTION		% of Kodiak 5 6		Days from May 31 5 6			Disease ratings ⁷ (1-9)	
DANKO	— Good winterhardness; Susceptible to snow mold	FR	115 120	Fair	73 80	3	2	3	4
KODIAK	— Excellent winterhardness; Resistant to snow mold	FR	100 100	Fair	76 83	3	2	3	4

WINTER TRITICALE			% of Borden						
DECADE	— Feed quality; Fair winterhardness	FR	120 80	Good	64 70	—	—	4	4
OAC TRILLIUM	— Feed quality; Fair winterhardness	FR	130 90	Good	66 71	—	—	4	4

S - Susceptible; R - Resistant

- May not indicate performance in Upper Saint John River Valley
- Seed Supply Limited
- Will be removed in 1990
- Maturity based on average of the region
- Valid for Annapolis Valley and similar climatic zones
- All areas other than in No. 5
- Disease Rating 1 = Very resistant 9 = Very susceptible

Recommendation Status

- Provisional Recommendation (PR) — new variety that shows strong yield/agronomic traits under limited testing.
- Full Recommendation (FR) — top classification, variety has performed well under extensive testing and meets performance criteria.
- Out Classed (OC) — Varieties that are now being significantly outperformed by newer ones, will be dropped from 1991 list.

HERBICIDE SELECTION FOR SPECIFIC WEEDS IN CEREALS NOT UNDERSEEDED

HERBICIDES *most reliable treatments	Annual Broad Leaves									Annual Grasses					Perennials				
	chickweed	corn spurry	lady's-thumb	lamb's-quarters	mustards	mayweed	pigweeds	ragweed	buckwheat, wild	henbane	barnyard grass	foxtail, green	foxtail, yellow	old witch grass	wild oats	birdweed, field	sow-thistle	thistle, Canada	quackgrass
AFTER HARVEST																			
Amitrole (AMITROL-T, CYTROL)																	*	*	*
Glyphosate (ROUNDUP)																	*	*	
Glyphosate - Frigate (ROUNDUP - FRIGATE)																			*
Glyphosate - Enhance (ROUNDUP - ENHANCE)																			*
Dalapon (DOWPON-M, BASFAPON)																			*
PREPLANT																			
Glyphosate (ROUNDUP)																	*	*	*
Glyphosate - Frigate (ROUNDUP - FRIGATE)																			*
Glyphosate - Enhance (ROUNDUP - ENHANCE)																			*
OATS, SPRING WHEAT, BARLEY AND WINTER WHEAT (SPRING APPLICATION ONLY)																			
2,4-D amine				*	*		*	*											
MCPA				*	*		*	*	*	*									
1 2,4-DB (EMBUTOX 625, COBUTOX)				*			*	*	*	*							*	*	
1 MCPB/MCPA (TROPOTOX PLUS)				*	*		*	*	*	*									
Refine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
Dicamba (BANVEL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							*	*	*
2,4-D/Mecoprop/Dicamba (KIL-MOR)			*	*	*	*	*	*	*	*							*	*	*
MCPA/Mecoprop/Dicamba (TARGET)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						*	*	*
Dicamba/MCPA (DYVEL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						*	*	*
Bromoxynil (PARDNER)			*	*	*	*	*	*	*	*									
Bromoxynil/MCPA (1:1) (BUCTRIL M)			*	*	*	*	*	*	*	*									
2 Cyanazine/MCPA (BLAGAL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
2 Propanil/MCPA (STAMPEDE CM)			*	*	*	*	*	*	*	*		*	*						
2 Mecoprop (COMPITOX)	*		*																
WHEAT AND BARLEY																			
Difenzoquat (AVENGE 200C)															*				
Diclofop-methyl (HOE-GRASS)												*	*	*	*	*			
Dichloroprop/2,4-D (ESTAPROP, DIPHENOPROP)			*	*	*		*	*	*										
WHEAT																			
Flamprop-methyl (MATAVEN)															*				
WINTER WHEAT-FALL APPLICATION																			
Bromoxynil (PARDNER)			*	*	*	*	*	*	*										
Bromoxynil/MCPA (BUCTRIL-M)			*	*	*	*	*	*	*										

¹Recommended Application on Underseedings of Alfalfa/Clover only.

²Not registered for Winter Wheat spring application.

For more details regarding weed control, refer to Publication 75, GUIDE TO WEED CONTROL. Chemical names, as well as an example of specific trade names are given. Products may be available under other trade names.

CEREAL INSECT CONTROL

APHIDS	ARMYWORMS
DIMETHOATE (CYGON OR ROGOR) MALATHION	CARBARYL (SEVIN XR PLUS) CHLORPYRIFOS (LORSBAN) MALATHION METHOXYCLOR TRICHLORFON (DYLOX) (Do not apply with in 21 days of harvest)
Temperatures of about 21°C result in best aphid control.	Apply in sufficient water to wet foliage thoroughly.
Apply before crop heads, or aphids have developed wings.	
FOR ADDITIONAL INFORMATION ON INSECTS, SEE PUBLICATION 116, DISEASES AND INSECT PESTS OF CEREALS IN THE ATLANTIC PROVINCES.	

CEREAL SEED TREATMENTS			OATS		BARLEY		WHEAT		RYE		ALL CEREALS	
COMMON NAME	PRODUCT NAME	FORMULATION	-covered smut	-loose smut	-seedling blight	-root rot	-covered smut	-loose smut	-seedling blight	-root rot	-seedling blight	-root rot
MANEB	AGROX NM	P-DB, Su, WP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
CARBATHIIN + THIRAM	AGROX FLOWABLE VITAFLO 280 VITAVAX POWDER	P-DB, Su	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
SEED TREATMENTS WITH INSECTICIDES												
MANEB + LINDANE	MERGAMMA NM CO-OP NN DUAL PURPOSE	P-DB, Su	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
CARATHIIN + THIRAM + LINDANE	VITAVAX DUAL PURPOSE	P-DB, L	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

P-DB (Powder Drillbox); L (Liquid); Su (Suspension); WP (Wettable Powder) + Most reliable treatment, *Partial Control
 * Seeding blight may be caused by several seed and soil borne organisms, including Fusarium.

CEREAL FOLIAR FUNGICIDES (CHECK REGISTRATION STATUS ON LABEL)			W WHEAT Powdery Mildew ² Septoria ³ rusts		SP WHEAT Powdery Mildew ² Septoria ³		BARLEY Net blotch Spot blotch scald		Pre-Harvest Interval Days
COMMON NAME	PRODUCT NAME	FORMULATION ¹							
MANCOZEB	DITHANE M-45	WP	-	+	-	-	+	NR ⁴	40
PROPICONAZOLE	TILT	Su	-	+	+	+	+	+	45
TRIADIMEFON	BAYLETON	WP	+	-	+	NR ⁴	NR ⁴	NR ⁴	60

¹WP - wettable powder, Su - Solution

²Bayleton - 4 weeks control, Tilt 2 weeks control

³Tilt - 4 weeks control, Dithane M-45 2 weeks control

⁴NR - Not registered for this crop in 1988

+ Denotes effective control

- Non-effective control

Warning: Safety data and registration of these products are under review. Directions for use and cautionary statements should be carefully followed. Read the label before using.

*CEREAL ANTILODGING COMPOUNDS

COMMON NAME	PRODUCT NAME	CROP
CHLORMEQUAT CHLORIDE	CYCOCEL EXTRA	Registered for Absolvent, Lennox, Monopol, Norstar and Vuka Winter Wheat
ETHEPHON	CERONE	Registered for all registered Wheat and Barley varieties - except Birka

*Anti lodging Agents should be used only when risk of lodging is high. Time of application is critical. Do not apply when crop is under stress due to cold or lack of moisture.

SOYBEAN VARIETIES

Zone ¹	Varieties	Heat Units	Yield (% of Maple Amber)	Tolerance to Metribuzin	Häm Color
Zone 1 Zone 2 Zone 3 → → → → → → → → → → → →	Maple Presto	2200	79	T	Brown
	Maple Ridge	2300	88	S	Yellow
	Baron	2350	101	S	Brown
	KG20	2350	103	T	Yellow
	Maple Amber	2400	100	S	Brown
	Maple Isle ²	2450	105	T	Yellow
	KG30	2550	113	T	Brown
	Maple Arrow	2550	105	T	Brown
	McCall	2550	101	T	Yellow
	Bicentennial	2550	104	T	Brown

T - Tolerant

S - Susceptible

1 Refer to Zones for Corn Production on Page 4

2 More sensitive to cool spring soil conditions



SOYBEAN HERBICIDE WEED CONTROL RATINGS

This chart is intended to help in the selection of a herbicide to control specific weeds in soybeans. For complete information on rates and details of application, refer to the current GUIDE TO WEED CONTROL, Publication 75.

The chemical ratings in this chart give general comparisons for use as described in the GUIDE. Under unfavourable conditions (e.g. too dry, too wet, too cold or poor application) the herbicides may not be as effective as indicated.

			ANNUAL BROADLEAVES										ANNUAL GRASSES				PERENNIALS					CROP TOLERANCE
RATING: E - Excellent G - Good F - Fair P - Poor			ppi - preplant incorporated pre - pre-emergence post - postemergence																			
TREATMENT	TRADE NAME	METHOD OF APPLICATION	bucktail wild	chickweed	corn spurry	henbit	lady's-thumb	lamb's-quarters	mayweed	mustards	pigweeds	ragweed	barnyard grass	foxtails	old witch grass	wild oats	bindweed, field	horsetail	quackgrass	sow-thistle	thistle, Canada	
Amitrole T Glyphosate Glyphosate	Amitrol-T, Cytrol Roundup Roundup	preplant preplant spot treat or after harvest	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
Glyphosate + Frigate	Roundup + Frigate	spot treat or after harvest	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
Glyphosate + Enhance	Roundup + Enhance	preplant or after harvest	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
Metolachlor Trifluralin Metolachlor + metribuzin Trifluralin + chloramben Trifluralin + metribuzin	Dual Treflan, Rival Dual plus Lexone or Sencor Treflan + Amben Treflan or Rival + Sencor or Lexone	ppi ppi ppi ppi ppi	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G	P P P P P P P P P F P F P F G - P G P G G G G E E G E E E E F F P E E - P E G E G E G E E G E E G		
Metolachlor plus one of (Tank mix) 5 treatments below	Dual	pre																				
Chloramben Linuron Metobromuron Metribuzin Monolinuron	Amben Afolan, Lorox Patoran (Galex) Lexone, Sencor Alesin	pre pre pre pre pre	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G	E - G P E E - P E G E - E P E E P E E G E - G F E E - E E E G G E G E E G E E E E - F - E E - E E G		
Bentazon Bentazon + Fenoxaprop-ethyl Fenoxaprop-ethyl Diclofop-methyl Sethoxydim Fluzifop-butyl	Basagran Basagran + Excel Excel Hoe-Grass Poast Fusilade	post post post post post post	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	F - P P P P P P P P P F - P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	

(*) Indicates the annual weeds will be controlled if emerged, and the perennials can be controlled if treated at the optimum time which is usually not the same time as for quack grass. (-) indicates lack of data.

- Good control of these perennial weeds may require two applications of BENTAZON + ASSIST oil concentrate about 7 to 10 days apart.
 - Optimum growth stages for best control of these weeds will not likely be attained prior to planting soybeans. See further details on label.
- (a) On soils of less than 2.5% O.M. and when the varieties recommended in this Guide are grown, use the lowest recommended rate of linuron.
- (b) Do not use metribuzin on Maple Amber, Maple Ridge, or Baron varieties. If soil O.M. is lower than 2.5%, all varieties recommended in this Guide may also be injured.


ZADOKS GROWTH SCALE FOR CEREALS

PRINCIPAL (0-9) AND SECONDARY (00-99) GROWTH STAGES FROM THE ZADOKS DECIMAL CODE

0 GERMINATION	3 STEM ELONGATION	6 FLOWERING
00 Dry seed	30 Main leaf sheath erect	60 —
01 Start of water absorption	31 First node detectable	61 Beginning of flowering
02 —	32 Second node detectable	62 —
03 Absorption complete	33 Third node detectable	63 —
04 —	34 Fourth node detectable	64 —
05 Root emerged from seed	35 Fifth node detectable	65 Flowering half way
06 —	36 Sixth node detectable	66 —
07 Shoot emerged from seed	37 Flag leaf just visible	67 —
08 —	38 —	68 —
09 First leaf just visible	39 Flag leaf collar just visible	69 Flowering complete
1 SEEDLING GROWTH	4 BOOTING	7 MILK DEVELOPMENT
10 First leaf through coleoptile	40 —	70 —
11 First leaf unfolded	41 Flag leaf sheath extending	71 Kernel water ripe
12 Two leaves unfolded	42 —	72 —
13 Three leaves unfolded	43 Boots just visibly swollen	73 Early milk
14 Four leaves unfolded	44 —	74 —
15 Five leaves unfolded	45 Boots swollen	75 Medium milk
16 Six leaves unfolded	46 —	76 —
17 Seven leaves unfolded	47 Flag leaf sheath opening	77 Late milk
18 Eight leaves unfolded	48 —	78 —
19 Nine or more leaves unfolded	49 —	79 —
2 TILLERING	5 HEAD EMERGENCE	8 DOUGH DEVELOPMENT
20 Main shoot only	50 —	80 —
21 Main shoot and one tiller	51 First spikelet of head just visible	81 —
22 Main shoot and two tillers	52 —	82 —
23 Main shoot and three tillers	53 1/4 of head emerged	83 Early dough
24 Main shoot and four tillers	54 —	84 —
25 Main shoot and five tillers	55 1/2 of head emerged	85 Soft dough
26 Main shoot and six tillers	56 —	86 —
27 Main shoot and seven tillers	57 3/4 of head emerged	87 Hard dough
28 Main shoot and eight tillers	58 —	88 —
29 Main shoot and nine or more tillers	59 Emergence of head completed	89 —

9 RIPENING

90 —
91 Kernel hard; difficult to divide
92 Kernel hard; not dented by thumbnail
93 —
94 Overripe, straw dead and collapsing
95 Seed dormant
96 Seed giving 50% germination
97 Seed not dormant
98 —
99 Seed ready for planting



Suggested changes for the 1991 edition of Publication 100A should be sent to the Field Crop Section Director for the province for forwarding to the appropriate field crop committees by April 1, 1990.

GRANDES CULTURES

GUIDE SUR LE CHOIX DES VARIÉTÉS ET DES ANTIPARASITAIRES



1990

**POUR LES
PROVINCES
DE L'ATLANTIQUE**

Préparé par
LES COMITÉS CONSULTATIFS SUR LES
CÉRÉALES, LES OLÉAGINEUSES, LE MAÏS
ET LES PLANTES FOURRAGÈRES

Publication autorisée par le
Comité de coordination des services
agricoles des provinces de l'Atlantique



Pour de plus amples renseignements sur la production des grandes cultures, voir la publication
100 intitulée GUIDE DES GRANDES CULTURES.

VARIÉTÉS RECOMMANDÉES DE PLANTES FOURRAGÈRES

LÉGUMINEUSES

Remarque: La présence de verticilliose a été identifiée dans la région. Si cette maladie est un problème dans votre localité, veuillez consulter votre spécialiste en Grandes Cultures ou représentant agricole local avant de sélectionner une variété de luzerne.

LUZERNE FLAMANDE	Date approximative* de la floraison	Rendement (% de Saranac)	Résistance au froid	Réaction à la Verticilliose
Apica	15 juin	102	Très bonne	S
Anchor	15 juin	100	Bonne	S
Angus	15 juin	100	Bonne	S
Citation	15 juin	98	Bonne	S
Pacer	15 juin	88	Bonne	S
Saranac	15 juin	100	Bonne	S
Thor	15 juin	100	Bonne	S
532	15 juin	100	Bonne	S

LE RENDEMENT MOYEN DU SARANAC AUX ESSAIS DES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE ÉTAIT DE 8,8 T/HA.

LUZERNE ORDINAIRE	Date approximative* de la floraison	Rendement (% d'Iroquois)	Résistance au froid	Réaction à la Verticilliose
Algonquin	20 juin	102	Très bonne	S
Blazer	20 juin	100	Bonne	S
Iroquois	20 juin	100	Bonne	S
120	20 juin	102	Bonne	S

LE RENDEMENT MOYEN DE L'IROQUOIS AUX ESSAIS DES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE ÉTAIT DE 8,6 T/HA.

TRÈFLE ROUGE	Date approximative* de la floraison	Rendement (% de Florex)	Résistance au froid
		1 ^{ère} coupe	2 ^{ème} coupe

À DOUBLE COUPE

Marino	23 juin	106	112	Très bonne
Jubilatka	23 juin	101	107	Bonne
Tapiopoly	23 juin	92	106	Bonne
Tristan	23 juin	84	97	Bonne
Prosper 1	23 juin	91	98	Bonne
Violetta R.V.P.	23 juin	93	101	Bonne
Hungaropoly	23 juin	92	104	Bonne
Arlington	25 juin	90	99	Bonne
Lakeland	25 juin	91	110	Bonne
Florex	27 juin	100	100	Bonne

À COUPE UNIQUE

Altaswede	20 juillet	116	—	Bonne
-----------	------------	-----	---	-------

LE RENDEMENT MOYEN DU FLOREX AUX ESSAIS DES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE ÉTAIT DE 4,4 T/HA POUR LA 1^{ère} COUPE ET DE 2,8 T/HA POUR LA 2^{ème} COUPE.

LOTIER CORNICULÉ	Date approximative* de la floraison	Repousse	Résistance au froid
Viking	20 juin	Bonne	Bonne
Leo	25 juin	Bonne	Très bonne
Empire	2 juillet	Faible	Très bonne

TRÈFLE BLANC (LADINO)

Sacramento	26 juin	Bonne	Bonne
Sonja	26 juin	Excellente	Très bonne

*LES DATES D'ÉPIASOIN ET DE FLORAISON PEUVENT VARIER À L'INTÉRIEUR DE LA RÉGION ET D'ANNÉE EN ANNÉE. LA MEILLEURE DATE DE RÉCOLTE RELATIVEMENT À LA QUALITÉ PEUT ÊTRE PLUS TÔT.

**S — DÉSIGNE QUE LA VARIÉTÉ EST SENSIBLE À LA VERTICILLOSE.

GRAMINÉES VIVACES

FLÉOLE DES PRÉS	Date d'épiaison*	Rendement (% de Champ) 1 ^{ère} coupe	2 ^{ème} coupe
Salvo	18 juin	91	92
Clair	20 juin	90	96
Toro	20 juin	100	91
Basho	20 juin	87	90
Richmond	23 juin	100	93
Champ	25 juin	100	100
Itasca	27 juin	108	73
Timfor	27 juin	112	86
Climax	29 juin	116	74
Drummond	2 juillet	114	57
Farol	9 juillet	129	74

LE RENDEMENT MOYEN DE CHAMP AUX ESSAIS DES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE ÉTAIT DE 5,5 T/HA POUR LA 1^{ère} COUPE ET DE 3,2 T/HA POUR LA 2^{ème} COUPE.

BROME	Date d'épiaison*	Repousse	Tolérance au drainage
Saratoga	15 juin	Bonne	Moyenne
Tempo	15 juin	Bonne	Moyenne

DACTYLE

Frode	12 juin	Excellente	Faible
Kay	16 juin	Excellente	Faible

FÉTUQUE DES PRÉS

Trader	19 juin	Bonne	Bonne
Mimer	19 juin	Bonne	Bonne

HYBRIDES DE FÉTUQUE ÉLEVÉE

Kenhy	17 juin	Bonne	Bonne
Johnstone	17 juin	Bonne	Bonne

ALPISTE ROSEAU

Palaton*	13 juin	Bonne	Excellente
Vanture*	13 juin	Bonne	Excellente
Vantage	14 juin	Excellente	Excellente

RAY-GRASS VIVACE

Norlea	2 juillet	Excellente	Moyenne
--------	-----------	------------	---------

FOURRAGES ANNUELS

RAY-GRASS ANNUEL	Type	Rendement (% de Lental)	Usage
Aubede	Westerwolds tétraploïde	119	foin, ensilage demi-sec, pâturage
Marshall	Westerwolds diploïde	120	foin, ensilage demi-sec, pâturage
Berapecta	Westerwolds tétraploïde	111	ensilage demi-sec, pâturage
Promenada	Westerwolds tétraploïde	104	ensilage demi-sec, pâturage
Maris Ledger	Italien tétraploïde	104	pâturage
Lental	Italien diploïde	100	pâturage
Bartolini	Italien diploïde	99	pâturage
Barmultra	Italien tétraploïde	97	pâturage

LE RENDEMENT MOYEN DE LENTAL AUX ESSAIS DES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE ÉTAIT DE 8,7 T/HA.

CHOU FOURRAGER	Hauteur (cm)	Rendement (% de Maris Kestrel)	Résistance au gel
Grüner Angeliter	120	112	Bonne
Maris Kestrel	80	100	Très bonne
COLZA FOURRAGER			
Barcoli	70	72	Moyenne

LE RENDEMENT MOYEN DU MARIS KESTREL AUX ESSAIS DES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE ÉTAIT DE 9,5 T/HA.

D'AUTRES CULTURES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES COMME FOURRAGE COMPLÉMENTAIRE. VOIR LA PUBLICATION 100.

L'UTILISATION DES HERBICIDES POUR LA RÉPRESSION DES MAUVAISES HERBES DANS LES CULTURES FOURRAGÈRES

REMARQUE: Les herbicides ne sont pas le seul moyen d'éliminer les mauvaises herbes. Il faut inclure dans un programme de répression des mauvaises herbes la propreté de la machinerie et du champ, la rotation des cultures, le labour des terres et la coupe des peuplements. Consultez la publication 100, GUIDE DES GRANDES CULTURES, pour élaborer un programme de répression des mauvaises herbes.

Les recommandations suivantes sont données sous forme concise. Pour plus de détails concernant l'utilisation de ces produits chimiques et le degré auquel les mauvaises herbes leur sont sensibles, voir la publication 75, GUIDE POUR LA RÉPRESSION CHIMIQUE DES MAUVAISES HERBES. Les noms chimiques ainsi qu'un exemple de nom commercial sont donnés. Les produits peuvent être disponibles sous d'autres noms commerciaux.

GRAMINÉES ÉTABLIES POUR LE PÂTURAGE OU LE FOIN

(MAUVAISES HERBES)

TRAITEMENT D'HERBICIDE/MOMENT OPPORTUN Les herbicides suivants sont désignés par leur nom chimique et à titre d'exemples vous trouverez des noms de marque.																
	Gallier (V)	Renouée (bouton d'or) (V)	Silène enfilé (V)	Mouron des oiseaux (A)	Lychide blanche (V)	Marguerite blanche (V)	Pissenit (V)	Verge d'or (V)	Ortie royale (A)	Renouée persicaire (A)	Chénopode blanc (A)	Camomille des chiens (A)	Moutardes (A)	Amarante (A)	Matricaire odorante (A)	Plantains (V)
TRAITEMENT DES PRÉSEMS Glyphosate (Round-up) Le Round-up appliqué à l'automne donne les meilleurs résultats.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
EPTC (Eptam) cultures de luzerne et de lotier seulement.				*							*			*		
Trifluralin (Treflan) cultures de luzerne seulement.				*							*			*		
NOUVELLES SEMENCES DE LEGumineuses ET DE MÉLANGE DE LÉGumineuses ET DE GRAMINÉES 2,4-DB (Embutox 625, Cobutox)							*	*		*	*			*	*	
2,4-DB + MCPA (la luzerne pourrait être endommagée)		*					*	*		*	*		*	*	*	*
MCPB/MCPA (Tropotox Plus)		*					*	*		*	*		*	*	*	*
NOUVELLES SEMENCES ET CULTURES ÉTABLIES DE GRAMINÉES 2,4-D						*	*	*		*	*		*	*	*	*
MCPA	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Dicamba (Banvel)			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

C-REMARQUE: Les herbicides ne sont qu'une méthode utilisée pour éliminer les mauvaises herbes. Consultez la publication 100, GUIDE DES GRANDES CULTURES, et la publication 75, GUIDE POUR LA RÉPRESSION CHIMIQUE DES MAUVAISES HERBES pour planifier un programme de répression des mauvaises herbes.

REMARQUE: Pour plus de renseignements sur les taux d'application de ces herbicides et d'autres, consultez la publication 75.

CLASSIFICATION DES PLANTES

- (A) Annuelle
- (AH) Annuelle d'hiver
- (B) Bisannuelle
- (V) Vivace

RÉACTION À L'HERBICIDE

Dans de nombreux cas, la réaction dépend du stade de croissance de la mauvaise herbe. LISEZ L'ÉTIQUETTE.

RÉPRESSION DES INSECTES NUISIBLES AUX PLANTES FOURRAGÈRES

Insecte	Traitement
Hespérie des graminées	Dipel PM Thuricide HPC

Conservez les herbicides dans le contenant original et LISEZ L'ÉTIQUETTE

HYBRIDES DE MAÏS RECOMMANDÉS

PRODUCTION DE GRAIN

Les hybrides avec un * sont de nouvelles recommandations pour cette année.

Zone	Hybride	Fournisseur ¹ canadien	Type ² d'hybride	Nombre d'années station	% de rupture de tiges	% de taux ³ d'émergence	% d'humidité ⁴ du grain	Rendement à 15,5 % d'humidité (t/ha)	
Zone 1	Zone 3	G-4017 (CG)	2	HT	14	13	93	26,1	5,0
		K610 (King)	6	HT	29	12	94	28,1	5,5
		DK-235 (Deklab)	4	HT	9	10	96	28,5	6,3
		Co-op 2335*	3	HS	9	17	93	29,1	6,1
		PX 9028 (NK)*	8	HT	10	9	87	29,7	5,7
		3979 (Pioneer)*	10	HS	9	12	96	29,8	6,4
		Co-op 2325	3	HS	14	10	88	30,0	6,2
		Pickseed 2477*	9	HT	10	8	95	30,2	6,2
		Co-op 6312*	3	HT	12	20	89	31,0	5,5
		G-4083 (CG)	2	HS	37	13	91	31,0	5,5
		Pickseed 2555	9	HS	34	13	84	31,4	6,4
	Zone 2	Pickseed 2555A	9	HSM	33	13	90	32,5	6,0
		Hyland HL 2219	5	HS	32	14	80	35,2	6,3
		Co-op S259	3	HS	36	13	80	35,8	6,3
		T778 (Dekalb)	4	AH	37	13	86	35,8	6,2

1 Voir la liste des fournisseurs pour les noms et adresses.

2 HS = hybride simple; HT = hybride triple; HSM = hybride simple modifié; AH = autre hybride.

3 Le taux d'émergence est déterminé au stade 5 feuilles, avant l'éclaircissage à un nombre constant de plant par parcelle. Les données sont calculées selon une moyenne de 3 ans.

4 Les données représentent les moyennes de tous les essais effectués dans les Maritimes pendant au moins 2 ans avec un nombre de lieux d'essais annuels pouvant aller jusqu'à 6. Les données du tableau représentent le rendement en zone 2. Pour évaluer le rendement d'un hybride en zone 1, ajouter 0,8 t/ha au rendement et soustraire 2,7 au % d'humidité du grain. Pour la zone 3, soustraire 0,7 t/ha du rendement et ajouter 5,4 au % d'humidité du grain.

PRODUCTION DE MAÏS D'ENSILAGE

Les hybrides avec un * sont de nouvelles recommandations pour cette année.

Zone	Hybride	Fournisseur ¹ canadien	Type ² d'hybride	Nombre d'années station	% de taux ³ d'émergence	Plante entière ⁴		
						matière sèche (%)	Rendement en matière sèche (t/ha)	
Zone 1	Zone 3	Pickseed 2444*	9	HSM	18	87	29,1	10,7
		3979 (Pioneer)*	10	HS	16	93	28,9	10,5
		Co-op 6312*	3	HT	15	89	29,1	10,5
		DK-291 (Deklab)*	4	HSM	9	92	28,8	10,9
		G-4017 (CG)	2	HT	20	91	28,8	10,7
		K730 (King)	6	HT	22	90	28,7	9,8
	Zone 2	Pickseed 2555A	9	HSM	31	88	28,2	11,2
		G-4083 (CG)	2	HS	37	90	28,0	9,9
		PX 9028 (NK)*	8	HT	16	87	27,3	10,9
		PX 9060 (NK)*	8	HS	18	91	27,0	10,7
		Bishop 30-30	1	HT	35	75	26,5	11,1
		3957 (Pioneer)	10	HS	37	87	26,4	11,0
		Co-op S259	3	HS	37	78	26,1	11,3


1 Voir la liste des fournisseurs pour les noms et adresses.

2 HS = hybride simple; HT = hybride triple; HSM = hybride simple modifié;

3 Le taux d'émergence est déterminé au stade 5 feuilles, avant l'éclaircissage à un nombre constant de plant par parcelle. Les données sont calculées sur moyenne de 3 ans.

4 Les données représentent les moyennes de tous les essais effectués dans les Maritimes pendant au moins 2 ans avec un nombre de lieux d'essais pouvant aller jusqu'à 7. Les données du tableau représentent le rendement en zone 2. Pour évaluer le rendement d'un hybride en zone 1, ajouter 0,8 t/ha au rendement en matière sèche et ajouter 4,0 du % de matière sèche. Pour la zone 3, utiliser les rendements pour la zone 2 (tableau ci-dessus) et soustraire 2,1 du % de matière sèche.

ZONES DE PRODUCTION DE MAÏS



Zone 1: Zone la plus productive pour la production de grain ou d'ensilage. L'utilisation d'hybrides à maturité variée peut étaler la période de moisson.

Zone 2: Des hybrides hâtifs sont requis pour une bonne production de maïs ensilage. Les hybrides de maïs-grain les plus hâtifs produiront des rendements acceptables de maïs-grain humide ou de maïs épi entier humide.

Zone 3: Seuls les hybrides les plus hâtifs produiront un ensilage acceptable dans cette zone. La production de maïs-grain humide ou épi entier humide est possible la plupart des années avec les hybrides très hâtifs.

Zone 4: La production de maïs comporte de nombreux risques. Le maïs gèle habituellement avant d'atteindre une maturité appropriée à l'ensilage.

FOURNISSEURS CANADIENS DE SEMENCES DE MAÏS

MARQUE DE COMMERCE

BISHOP
CG
CO-OP
DEKALB
HYLAND
MINAS
NK
PICKSEED
PIONEER
PRIDE

FOURNISSEUR CANADIEN

1. Bishop Seeds Ltd.
2. Ciba-Geigy Seeds Ltd.
3. United Cooperatives of Ontario
4. Dekalb Canada Ltd.
5. W.G. Thompson & Sons Ltd.
6. Minas Seed Cooperative Ltd.
7. Northrup King Co.
8. Otto Pick & Sons Seeds Ltd.
9. Pioneer Hi-Bred Ltd.
10. King Agro Inc.

ADRESSE

C.P. 338, Belleville, Ontario K8N 5A5
Ailsa Craig, Ontario NOM 1A0
C.O. 1239, Chatham, Ontario N7M 5R9
R.R. 2, Glanworth, Ontario NOL 5K5
C.P. 130, Blenheim, Ontario NOP 1A0
C.P. 130, Canning, N.-É. BOP 1H0
C.P. 1207, Cambridge, Ontario N1R 6C9
C.P. 126, Richmond Hill, Ontario L4C 4X9
C.P. 730, Chatham, Ontario N7M 5L1
C.P. 1088, Chatham, Ontario N7M 5L6

ÉVALUATION DES HERBICIDES POUR LE MAÏS

Les herbicides ne sont pas le seul moyen d'éliminer les mauvaises herbes. Il faut inclure dans un programme de répression des mauvaises herbes la propriété de la machinerie et du champ, la rotation des cultures, le labour des terres et la coupe des peuplements. Consultez la publication 100, Guide des grandes cultures, pour élaborer un programme de répression des mauvaises herbes.

Ce tableau vous aidera à choisir un herbicide pour éliminer les mauvaises herbes qui nuisent à la culture du maïs. Pour de plus amples renseignements sur les doses et les méthodes d'application, consultez le dernier numéro du GUIDE DE RÉPRESSION CHIMIQUE DES MAUVAISES HERBES (publication 75).

Les évaluations chimiques présentées dans ce tableau donnent des comparaisons générales sur l'utilisation des produits tel qu'indiqué dans le guide. Dans des conditions défavorables (p. ex. excès de sécheresse, d'humidité ou de froid ou mauvaise application), les herbicides ne seront peut-être pas aussi efficaces.

ÉVALUATION:			ANNUELLES À FEUILLES LARGES															GRAMINÉES ANNUELLES						VIVACES							TOLÉRANCE DU MAÏS
E — excellent B — bon M — moyen F — faible																															
TRAITEMENT	Mode d'application ¹		renouée liseron	spargoute des champs	renouée persicaire	chou gras	moutarde	morelle	amarante	herbe à poux	triazine résistante	mauve jaune	pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire	panic capillaire	proso millet	liseron des champs	prêle des champs	asclépiade	souchet comestible	chiendent	laïteron des champs	chardon des champs						
Amitrole-T	présemis	• 2 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Glyphosate (Roundup)	présemis traitement localisé	• • •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Amitrole + atrazine	présemis + pré ou ppl	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E						
Atrazine + atrazine	présemis + pré ou ppl	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E						
Atrazine/simazine (EKKO)	ppl	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E						
Burylate + (Sutan +)	ppl	F B F	M	F	B	M	M	F	F	F	F	F	E	E	B	E	E	M	E	E	E	E	E	E	E						
Burylate plus + atrazine (Sutazine)	ppl	E E E	E	E	E	E	E	B	B	F	B		E	E	B	E	E	M	E	E	E	E	E	E	E						
Burylate plus + cyanazine (Bladex)	ppl	- - -	E	E	E	M	E	F	M				E	E	B	E	E	M		E	E	E	E	E	E						
Cyanazine/atriazine (Blazine)	ppl	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	F	B	E	B	E	E	F	M	E	E	E	E	E	E						
EPTC plus (Eradicane)	ppl	F B M	B	F	B	B	M	M	F	F			E	E	B	E	E	M		F	M	F	B	F	F						
EPTC plus + atrazine	ppl	E E E	E	E	E	E	E	B	B	F	F		E	E	B	E	E	M		F	M	F	B	M	F						
Metolachlore (Dual)	ppl	F F F	F	F	F	B	F	F	F	F	F		E	E	B	E	E	F		F	F	F	B	F	F						
Metolachlore + atrazine (Primextra)	ppl	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	F	M	E	E	B	E	E	F		F	F	F	B	F	F						
Metolachlore + cyanazine	ppl	E - -	E	E	E	E	B	E	F	M			E	E	B	E	E	F		F	F	B	F	F	F						
Simazine ⁴	ppl	E E E	E	E	E	E	E	E	E	F	M		E	E	M	E	E	F		F	F	F	M	M	F						
Atrazine ⁴	pré	E E E	E	E	E	E	E	E	E	F	M		B	F	F	B	B	F		F	F	F	M	M	F						
Atrazine + dicamba (Markman)	pré	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	B		B	F	F	B	B	F		F	F	F	M	M	F						
Atrazine/simazine (EKKO)	pré	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	F	M	E	M	E	E	F			F	F	F	M	M	F						
Cyanazine (Bladex)	pré	B - B	E	E	E	E	M	E	F	M			M	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						
Cyanazine + atrazine (Blazine)	pré	E E E	E	E	E	E	E	E	E	F	M		B	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						
Cyanazine + dicamba	pré	B E E	E	E	E	E	E	E	E	E	B		M	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						
Linuron + atrazine	pré	E - -	E	E	E	B	E	E	E	M	M		M	M	M	F	F			F	F	F	F	F	F						
Metolachlore (Dual)	pré	F F F	F	F	F	B	F	F	F	F			E	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						
Metolachlore + atrazine (Primextra)	pré	E E E	E	E	E	E	E	E	E	F	M		E	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						
Metolachlore + cyanazine	pré	E - -	E	E	E	E	B	E	F	M			E	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						
Metolachlore + dicamba	pré	B B E	E	E	E	E	E	E	E	E	B		E	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						
Metolachlore + atrazine + dicamba	pré	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	B		E	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						
Simazine ⁴	pré	E E E	E	E	E	E	E	E	E	F	M		E	E	M	E	E	F		F	F	F	M	M	F						
Atrazine ⁴	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	F	M		E	E	M	E	E	F		F	F	F	M	M	F						
Atrazine + dicamba	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	F		B	F	F	M	B	F		F	F	F	M	M	F						
Atrazine + huile	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	F	M		E	F	F	B	B	F		M	M	F	M	M	F						
Atrazine/simazine + huile (EKKO)	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	F	B		E	M	M	E	E	F		F	M	F	M	M	M						
Bentazone (Basagran)	post	M - -	E	B	E	B	B	E	E	E			F	F	F	F	F			B ³	F	B ³	F	B ³	B ³						
Bentazone/simazine (Laddock)	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		B	F	F	M	B	F		M	F	F	B ³	F	M						
Bromoxynil ⁴	post	E - -	E	E	E	B	E	B	E	E	E		F	F	F	F	F	F		M	F	F	F	M	M						
Bromoxynil/MCPA ⁴	post	E - -	E	E	E	E	E	B	E	E	E		F	F	F	F	F	F		M	F	F	F	M	M						
Bromoxynil + atrazine	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		F	F	F	F	F	F		M	M	F	F	M	M						
Bromoxynil/MCPA + atrazine	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		B	F	F	B	B	F		M	M	F	F	M	M						
Cyanazine (Bladex)	post	B - B	E	E	E	E	M	E	F	B			M	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						
Cyanazine + atrazine	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	F	B		B	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						
Cyanazine + dicamba	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	F	B		M	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						
2,4-D ⁴	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		M	E	B	E	E	F		M	F	F	F	F	E						
2,4-DB/MCPB/MCPA	post	M F M	E	E	E	M	E	E	B	E			F	F	F	F	F	F		M	F	F	F	F	B						
Dicamba (Banvel)	post	B F F	M	B	M	B	M	E	E	E	E		F	F	F	F	F	F		B	F	F	F	F	B						
Dicamba + 2,4-D	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		F	F	F	F	F	F		B	F	F	F	F	E						
2,4-D + mécoprop + dicamba (Klimor)	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		F	F	F	F	F	F		B	F	F	F	F	E						
Linuron ⁴	post, dir.	E E E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	M	E	B	E	B		M	B	M	B	M	B						
MCPA (amine) ⁴	post	- M F	E	E	E	-	M	E	E	M			F	F	F	F	F	F		M	B	F	F	F	M						
Metolachlore + atrazine	post	E E E	E	E	E	E	E	E	E	F	E		E	E	B	E	E	F		F	F	F	F	F	F						

1 Application de présemis : utiliser pour le traitement des plantes vivaces émergées avant de travailler la terre. ppl = incorporation en présemis; pré = préémergences; post = postémergences; post, dir = postémergences dirigées

2 Indique que les annuelles seront éliminées si elles ont émergé et que les vivaces peuvent être éliminées si elles sont traitées au bon moment, lequel n'est habituellement pas le même pour le chiendent.

3 L'élimination efficace de ces plantes vivaces pour nécessiter deux applications de BENTAZON + CITOWETT PLUS à 7 à 10 jours d'intervalle.

4 Vendu sous diverses marques de commerce — voir pub 75F (Guide de contrôle chimique des mauvaises herbes) pour plus d'information.

5 + /Ces produits peuvent être mélangés dans le réservoir ou disponible commercialement en préparation pré-mélangée.

RÉPRESSION DES INSECTES S'ATTAQUANT AU MAÏS

Insecte	Traitement
Mouche des légumineuses	Diazinon - lindane Diazinon - capriane Counter 15G
Pyrale du maïs	Ambush 500 EC Furadan 4,8 F Sevine Laminate L
Taupin	Dyfonate 10 G Furadan G Counter 15 G

Insecte	Traitement
Légionnaire unipunctée	Savin Methion Méthoxychlore Dylox
Vers gris	Ambush Dylox Lorban 4 E Sevin 50 PM





VARIÉTÉS DE CÉRÉALES RECOMMANDÉES

		RECOMMANDATION*	POTENTIEL DE RENDEMENT ¹	RÉSISTANCE À LA VERSE	MATURITÉ*	BLANC ²	SEPTORIOSE ³	TACHE PALE ⁴	RAYURE RCTICULÉE ⁵	HELMINTHOSPORIOSE ⁶	FUSARIOSE ⁷
ORGE		% de LEGER									
ALBANY	- À 2 rangs; barbes rugueuses; pailles assez fortes	RC	97	Moyenne	96	1	-	5	7	2	
CADETTE	- À 6 rangs; barbes rugueuses; variété semi-naine; pailles robustes	RC	98	Exc.	99	3	-	7	6	2	
CHAPPAIS	- À 6 rangs; barbes rugueuses; pailles fortes	RP	109	Bonne	95	2	-	6	6	2	
HELENA	- À 2 rangs; barbes rugueuses; pailles fortes	RP	99	Bonne	95	1	-	5	7	2	
LEGER	- À 6 rangs; barbes lisses; pailles longues et robustes	RC	100	Bonne	96	2	-	6	5	3	
MICMAC	- À 2 rangs; barbes rugueuses; pailles assez fortes	RC	92	Moyen	95	1	-	5	7	2	
RODEO	- À 2 rangs; barbes rugueuses; pailles courtes et robustes	RC	97	Bonne	96	1	-	5	7	2	

AVOINE		% de SENTINEL										% Hull
BALDWIN	- Rendement élevé	RP	103	Bonne	105	-	7	-	-	4	25	
CAPITAL	- Rendement élevé; bas % d'écaillies; haut rendement de gruaux	RP	109	Bonne	104	-	7	-	-	3	25	
MARION	- Variété hâtive; bas % d'écaillies; haut rendement de gruaux	RC	107	Bonne	100	-	5	-	-	4	24	
NOVA	- Rendement élevé; bas % d'écaillies	RC	109	Bonne	103	-	7	-	-	4	24	
SENTINEL	- Résistance moyenne au cassage des tiges en fin de saison; pailles très fortes	RC	100	Exc.	105	-	4	-	-	2	28	
SHAW	- Résistance moyenne à la verse de fin de saison; bas % d'écaillies	RC	104	Bonne	103	-	7	-	-	3	24	
TIBOR	- Variété sans écaillies; haut % de protéines	RC	74	Exc.	105	-	7	-	-	6	3	

TRITICALE DE PRINTEMPS		% de MILTON									
BEAGUELITA	- Provençale; variété tardive	RC	110	Très Bonne	114	-	6	-	-	7	

BLÉ DE PRINTEMPS		% de MILTON									
BELVEDERE	- Blé de fourrage;	RC	106	Bonne	110	2	7	-	-	4	
MAX	- Blé de minoterie;	RC	100	Bonne	112	7	7	-	-	6	
MILTON ²	- Blé de fourrage; présente des barbes	CD	100	Bonne	112	2	7	-	-	4	
KATEPWA	- Blé de minoterie; recommandé pour l.-P.-É. seulement	RP	75	Bonne	108	7	7	-	-	3	

BLÉ DE D'HIVER		% de BORDEN 5 6									
ABSOLVENT	- Blé de minoterie; bonne résistance au froid; R. à la moisissure des neiges	RC	100	90	Bonne	62	68	8	6	-	3
BORDEN	- Blé de provençale; très bonne résistance au froid; R. à la moisissure des neiges	RC	100	100	Moyenne	62	68	5	6	-	3
MONOPOL	- Blé de minoterie; résistance moyenne au froid; se cultive mieux dans la vallée d'Annapolis et les régions au climat semblable; nécessite un haut taux d'ensemencement; S. à la moisissure des neiges	RC	100	85	Bonne	66	73	7	6	-	3

		% de KODIAK 5 6			jours à partir du 31 mai 5 6			échelle de ⁷ résistance (1-9)				
SEIGLE D'HIVER												
DANKO	- Bonne résistance au froid; S. à la moisissure des neiges	RC	115	120	Moyenne	73	80	3	2	3	-	4
KODIAK	- Excellente résistance au froid; R. à la moisissure des neiges	RC	100	100	Moyenne	76	83	3	2	3	-	4

		% de BORDEN										
TRITICALE D'HIVER		RC	120	80	Bonne	64	70	-	-	4	-	4
DECADE	- Provençale; résistance moyenne au froid;	RC	120	80	Bonne	64	70	-	-	4	-	4
OAC TRILLIUM	- Provençale; résistance moyenne au froid;	RC	130	90	Bonne	66	71	-	-	4	-	4

TS = Très sensible; S = sensible; R = résistant(e)

1. Ce rendement n'est pas nécessairement celui qu'on obtiendrait dans la vallée supérieure du Fleuve Saint-Jean.
2. Stock de semences limité.
3. Sera enlevé en 1990.
4. La maturité est déterminée selon la moyenne à l'intérieur d'une région.
5. Se cultive bien dans la vallée d'Annapolis et dans les régions présentant le même climat.
6. Se cultive bien dans toutes les régions sauf celles décrites au point 5.
7. Résistance à la maladie: 1 = très résistant(e) 9 = très sensible.

Recommandation

1. Recommandation provisoire (RP) - nouvelle variété qui démontre un bon rendement/traités agronomiques à la suite d'essais restreints.
2. Recommandation complète (RC) - meilleure classification; la variété a démontré un très bon rendement lors d'essais exhaustifs et elle répond aux critères de performance.
3. Classification dépassée (CD) - ces variétés sont désormais dépassées par de nouvelles variétés qui ont un meilleur rendement et elles ne figureront pas sur la liste de 1991.

SÉLECTION D'HERBICIDES POUR DES MAUVAISES HERBES SPÉCIFIQUES DANS LES CÉRÉALES DE PRINTEMPS QUI NE SERVENT PAS DE PLANTE-ABRI

HERBICIDES * les traitements les plus fiables	ANNUELLES À FEUILLES LARGES									GRAMINÉES ANNUELLES					VIVACES				
	moulin des oiseaux	spergule des champs	renouée persicaire	chou gras	moutarde	camomille	amarantides à racine rouge	herbe à poux	sarrasin sauvage	ortie royale	piet de coq	éclaire verte	éclaire jaunâtre	mousseline	folle-avoine	latéron	liseron des champs	chardon des champs	chardent
APRÈS LA RÉCOLTE																			
Amitrole (AMITROLE T, CYTROL)																	*	*	*
Glyphosate (ROUNDUP)																	*	*	*
Glyphosate + Frigate (ROUNDUP + FRIGATE)																		*	
Glyphosate + Enhance (ROUNDUP + ENHANCE)																		*	
Dalepon (DOWPON-M, BASFAPON)																		*	
PRÉ-SEMI																			
Glyphosate (ROUNDUP)																	*	*	*
Glyphosate + Frigate (ROUNDUP + FRIGATE)																		*	
Glyphosate + Enhance (ROUNDUP + ENHANCE)																		*	
AVOINE, BLÉ DE PRINTEMPS, ORGE ET BLÉ D'HIVER (APPLICATION AU PRINTEMPS SEULEMENT)																			
2,4-D amine			*	*	*	*	*	*	*										
MCPA			*	*	*	*	*	*	*	*									
¹ 2,4-D (EMBUTOX 625 COBUTOX)			*	*	*	*	*	*	*	*									
¹ MCPB/MCPA (TROPOTOX PLUS)			*	*	*	*	*	*	*	*									
Refine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
Dicamba (BANVEL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							*	*	*
2,4-D/Mécoprop/Dicamba (KIL - MOR)			*	*	*	*	*	*	*	*							*	*	*
MCPA/Mécoprop/Dicamba (Target)			*	*	*	*	*	*	*	*							*	*	*
Bromoxynil (PARDNER)			*	*	*	*	*	*	*	*							*	*	*
Bromoxynil/MCPA (1:1) (BUCTRIL M)			*	*	*	*	*	*	*	*									
² Cyanazine/ MAPA (BLAGAL)			*	*	*	*	*	*	*	*									
² Propanil/MCPA (STAMPEDE CM)			*	*	*	*	*	*	*	*									
² Mécoprop (COMPITOX)			*	*	*	*	*	*	*	*		*	*						
BLÉ ET ORGE																			
Difenzoquat (AVENGE 200C)															*				
Dictofop-méthyl (HOE-GRASS)											*	*	*	*	*				
(ESTAPROP, DIPHÉNOPROP)																			
BLÉ																			
Flamprop-méthyl (MATAVEN)															*				
BLÉ D'HIVER - APPLICATION D'AUTOMNE																			
Bromoxynil (PARDNER)			*	*	*	*	*	*	*	*									
Bromoxynil/MCPA (BUCTRIL-M)			*	*	*	*	*	*	*	*									
¹ Application recommandée sur les plantes-abris de luzerne et de trèfle seulement. ² Non homologué pour le traitement du blé d'hiver au printemps. Pour en savoir davantage sur la répression des mauvaises herbes, consulter la publication 75. GUIDE POUR LA RÉPRESSION CHIMIQUE DES MAUVAISES HERBES. Les noms chimiques de même que des marques de commerce spécifiques y sont mentionnés. Les produits chimiques peuvent être vendus sous différentes marques de commerce.																			

¹ Application recommandée sur les plantes-abris de luzerne et de trèfle seulement.

² Non homologué pour le traitement du blé d'hiver au printemps.

Pour en savoir davantage sur la répression des mauvaises herbes, consulter la publication 75. GUIDE POUR LA RÉPRESSION CHIMIQUE DES MAUVAISES HERBES. Les noms chimiques de même que des marques de commerce spécifiques y sont mentionnés. Les produits chimiques peuvent être vendus sous différentes marques de commerce.

RÉPRESSION DES INSECTES NUISIBLES AUX CÉRÉALES

PUCERONS	LÉGIONNAIRE
DIMÉTHOATE (CYGON OU ROGOR) MALATHION	CARBARYL (SEVIN) CHLORPYRIFOS (LORSBAN) MALATHION MÉTHOXYCLORE TRICHLORFON (DYLOX) (Ne pas appliquer au cours des 21 jours précédant la récolte.) Appliquer avec suffisamment d'eau pour que le feuillage soit bien mouillé.
A 21° C environ, on obtient une meilleure répression des pucerons. Appliquer avant l'épiaison ou lorsque les pucerons ont développé des alytres.	
POUR EN SAVOIR D'AVANTAGE SUR LES INSECTES, CONSULTER LA PUBLICATION 116, MALADIES ET PARASITES DES CÉRÉALES DES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE.	

TRAITEMENTS DES SEMENCES DE CÉRÉALES			avoine		orge		blé		seigle		vers fil-de-fer	
NOM COMMUN	NOM DU PRODUIT	FORMULE	-charbon couvent	-charbon nu	-brûlure des semis*	-pourriture des racines	-charbon nu	-brûlure des semis*	-pourriture des racines	-charbon nu	-brûlure des semis*	-pourriture des racines
MANÈBE	Agrox NM	BSP, Su, PM	+	+	+	+	+	+			+	+
CARBATHIINE	Agrox Flowable											
CARBATHIINE	Vitaflor 250	Su	+	+	+		+	+		+	+	
CARBATHIINE	Vitaflor 280		+	+	+	*	+	+	*	+	+	*
+ THIRAME	Vitavax Powder	BSP, Su.										
TRAITEMENTS DES SEMENCES AUX INSECTICIDES												
MANÈBE	Mergamma NM	BSP, Su	+	+	+	+	+	+		+	+	+
+ LINDANE	Co-op NM à double usage											
CARBATHIINE	Vitavax	BSP, L	+	+	+	*	+	+	*	+	+	*
+ THIRAME	à double usage											
+ LINDANE												

BSP (boîte du semoir à poudre); L (liquide); Su (suspension); PM (poudre mouillable).

+ Le traitement le plus efficace; *répression partielle

* La brûlure des semis peut être causée par divers organismes provenant de la semence ou du sol, incluant la fusariose.

FONGICIDES POUR LES CÉRÉALES (VÉRIFIEZ L'HOMOLOGATION SUR L'ÉTIQUETTE)											Jours avant la récolte
Nom commun	Nom de produit	Formule ¹	blé d'hiver -blanc ² -septoriose ³ -rouille	blé de printemps -blanc -septoriose	orge	-rayure réticulée -helminthos poriose -échaudure					
Mancozèbe	Dithane M-45	PM	-	+	-		NH ⁴				40
Propiconazole	Tilt	So	-	+	+		NH ⁴	+	+	+	45
Triadiméfon	Bayleton	PM	+	-	+		NH ⁴				60

¹ PM - poudre mouillable; So - solution

² Bayleton - efficace pendant 4 semaines; Tilt - efficace pendant 2 semaines

³ Tilt - efficace pendant 4 semaines, Dithane M-45 - efficace pendant 2 semaines

⁴ NH - non homologué pour cette culture en 1989

+ Contrôle efficace

- Contrôle non-efficace

Avertissement: L'homologation et les données sur l'utilisation sûre de ces produits sont actuellement à l'étude. Il faut suivre soigneusement les directives d'utilisation et les mesures de précaution. Lire l'étiquette avant d'utiliser.

*COMPOSÉS CHIMIQUES ANTI-VERSE POUR LES CÉRÉALES

Nom commun	Nom du produit	Culture
Chlorure de chlorméquat	Cycocel Extra	Homologué pour usage dans les cultures de blé d'hiver Absolvent, Lennox, Monopol, Nostar et Vuka.
Éthéphon	Cerone	Homologué pour usage sur toutes les variétés autorisées de blé et les variétés d'orge à l'exception de la variété Birka.

* Les produits anti-verse ne doivent être utilisés que lorsque les risques de verse sont élevés. Le moment de l'application est de la plus haute importance. Ne pas utiliser ces produits lorsque la culture est affaiblie par le froid ou un manque d'humidité.

SOJA

ZONE ¹	VARIÉTÉS	UNITÉS THERMIQUES	RENDEMENT (% de M. AMBER)	TOLÉRANCE AU MÉTRIBUZIN	COULEUR DU HILE
Zone 1 Zone 2 Zone 3	Maple Presto	2 200	78	T	brun
	Maple Ridge	2 300	85	S	jaune
	Baron	2 350	100	S	brun
	KG20	2 350	101	T	jaune
	Maple Amber	2 400	100	S	brun
	Maple Isle ²	2 450	104	T	jaune
	KG30	2 550	115	S	brun
	Maple Arrow	2 550	104	T	brun
	McCall	2 550	107	T	jaune
	Bicentennial	2 550	104	T	brun

T - Tolérant S - sensible

1. Consulter les zones de production du maïs à la page 5.

2. Sensible au sol froid du printemps



ÉVALUATION DES HERBICIDES POUR LE SOJA

Ce tableau vous aidera à choisir un herbicide pour éliminer les mauvaises herbes qui nuisent à la culture du soja. Pour de plus amples renseignements sur les doses et les méthodes d'application, consultez le dernier numéro du GUIDE DE RÉPRESSION CHIMIQUE DES MAUVAISES HERBES (publication 75).

Les évaluations chimiques présentées dans ce tableau donnent des comparaisons générales sur l'utilisation des produits telle qu'indiquée dans le guide. Dans des conditions défavorables (p. ex. excès de sécheresse, d'humidité ou de froid ou mauvaises application), les herbicides ne seront peut-être pas aussi efficaces.

			ANNUELLES A LARGES FEUILLES	GRAMINÉES ANNUELLES	VIVACES	
ÉVALUATION: E — excellent B — bon M — moyen F — faible			renouée lauron mouron des oiseaux spargouze des champs ortie royale renouée persicaire chou gras camomille moutarde amarante herbe à poux	paed de coq setaire panic capillaire folle avoine	lauron des champs prêle des champs chénopode lauron des champs chardon des champs	TOLÉRANCE DU SOJA
TRAITEMENT MARQUE DE COMMERCE MODE D'APPLICATION						
Amitrol T Glyphosate Glyphosate	Amitrol-T, Cytrol Roundup Roundup	présemis présemis trait. localisé ou après la récolte	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * B * * 2 * M 2 2 M P M M	B B F
Glyphosate + Frigate	Roundup + Frigate	trait. localisé ou après la récolte	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	P * * * B B F M M P * B * B	F F F
Glyphosate + Enhance	Roundup + Frigate	prémis ou après la récolte	* * * * * * * * * *	* * * * *	— — G — —	—
Metolachlore Trifluraline Metolachlore + métribuzine	Dual traflan, Rival Dual plus Lexone ou Sencor	ppi ppi ppi	F F F F F F F F F F M F M F M B — F B F B B B B E E B E E E	E E E — E E E B E E E —	F F F F F F F F F F F F F F F F F F	B B B
Trifluraline + chlorambène Triburaline + métribuzine	Traflan + Amiben Traflan ou Rival + Sencor ou Lexone	ppi ppi	E M M F E E — F E B E B E B E E B E E B	E E E B E E E B	F F F F F F F F F M	B B
Ethafuralin Ethafuralin + métribuzine	Edge Edge + Lexone ou Sencor	ppi ppi	E — — — P B — F B F E — — — E E — E E E	E E E — E E E —	P F F F F F P F F F F F	B B
Chlorambène Chlorambène + linuron Linuron (a) Monolinuron Métribromuron Métribuzine (b) Metolachlore	Amiben Amiben + Afolan, Linuron Afolan, Lorox Afolan Patoran (Galex) Lexone, Sencor Dual	pré pré pré pré pré pré pré	E M F F E E — F E B E B B F E E — B E B E M E F E E F E E B E — M — E E — E E B E — B — E E — E E B B B E B E E B E E E F F F F F F F F F F	B B B F B B B F M M M F M M M F M M F F B B B B E E E —	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	E E B B B B B
Metolachlore plus un des 5 traitements ci-dessous (mélangés dans le réservoir)	Dual	pré				
Chlorambène Linuron Métribromuron Métribuzine Monolinuron	Amiben Afolan, Lorox Patoran Lexone, Sencor Afolan	pré pré pré pré pré	E — B F E E — F E B E — E F E E F E E B E — B — E E — E E B B B E B E E B E E E E — M — E E — E E B	E E E — E E E — E E E — E E E B E E E —	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	B B B B B
Bentazon Bentazon + Fénoprop-éthyl Fénoprop-éthyl Diclofop-méthyl Sethoxydim Fluazifop-butyl	Basagran Basagran + Excel Excel Hoe-Grass Poast Fusilade	post post post post post post	M — F F E B — E B E M — F F E B — E B E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	F F F F F F F F E E F E E E F E E E E E E E E E	G ¹ f f G ¹ G ¹ B F F B B F F F F F F F F F F F F B F F F F E F F	B B B B B E

* Indique que les annuelles seront éliminées si elles ont émergé et que les vivaces peuvent être éliminées si elles sont traitées au bon moment, lequel n'est habituellement pas le même pour le chiendent. (-) indique un manque de données.

¹ L'élimination de ces plantes vivaces peut nécessiter deux applications de BENTAZON + huile concentrée ASSIST à 7 à 10 jours d'intervalle.

² Ces mauvaises herbes n'atteindront probablement pas leur plein développement, moment propice à leur répression, avant l'ensemencement du soja. Lire l'étiquette pour plus de détails.

(a) Si le sol contient moins de 2,5% de M.O. et que vous cultivez les variétés recommandées dans ce guide, appliquez le linuron au taux le plus bas.

(b) Ne pas utiliser du métribuzine sur les variétés Maple Ridge, KG20 et Baron. Si le sol contient moins de 2,5% de M.O., toutes les variétés recommandées peuvent aussi subir des dommages.

STADES DE DEVELOPPEMENT DES CEREALES SUR L'ECHELLE DE ZADOKS

LES STADES SONT NUMEROTÉS DE 0 À 9 ET LES STADES SECONDAIRES DE 00 À 99

0 GERMINATION

- 00 Graine sèche
- 01 Début de l'imbibition d'eau
- 02 —
- 03 Imbibition complète
- 04 —
- 05 Sortie de la racine
- 06 —
- 07 Sortie du cotéoptile
- 08 —
- 09 Première feuille juste au sommet du cotéoptile

1 CROISSANCE DE LA PLANTULE

- 10 Première feuille dégagée du cotéoptile
- 11 Première feuille étalée
- 12 Deux feuilles étalées
- 13 Trois feuilles étalées
- 14 Quatre feuilles étalées
- 15 Cinq feuilles étalées
- 16 Six feuilles étalées
- 17 Sept feuilles étalées
- 18 Huit feuilles étalées
- 19 Neuf feuilles étalées

2 TALLAGE

- 20 Tige principale (maître-brin) seule
- 21 Tige principale et une 2^{de}
- 22 Tige principale et deux talles
- 23 Tige principale et trois talles
- 24 Tige principale et quatre talles
- 25 Tige principale et cinq talles
- 26 Tige principale et six talles
- 27 Tige principale et sept talles
- 28 Tige principale et huit talles
- 29 Tige principale et neuf talles ou plus

3 ALLONGEMENT DE LA TIGE (MONTAISON)

- 30 Redressement
- 31 Premier noeud décelable
- 32 Deuxième noeud décelable
- 33 Troisième noeud décelable
- 34 Quatrième noeud décelable
- 35 Cinquième noeud décelable
- 36 Sixième noeud décelable
- 37 Dernière feuille tout juste visible
- 38 —
- 39 Ligule ou col de la dernière feuille tout juste visible

4 GONFLEMENT

- 40 —
- 41 Allongement de la gaine de la dernière feuille
- 42 —
- 43 Début de gonflement visible
- 44 —
- 45 Gonflement avancé, inflorescence non visible
- 46 —
- 47 Ouverture de la gaine de la feuille étendard
- 48 —
- 49 Barbes visibles (cultivars barbus)

5 ÉPIAISON

- 50 —
- 51 Premier épillet visible
- 52 —
- 53 L'inflorescence est sortie au quart
- 54 —
- 55 L'inflorescence est sortie à la moitié
- 56 —
- 57 L'inflorescence est sortie aux trois-quarts
- 58 —
- 59 L'inflorescence complètement dégagée

6 FLORAISON

- 60 —
- 61 Début de la floraison
- 62 —
- 63 —
- 64 —
- 65 Mi-floraison (la moitié des étamines encore immatures)
- 66 —
- 67 —
- 68 —
- 69 Floraison terminée

7 STADE LAITEUX


- 70 —
- 71 Grain aqueux
- 72 —
- 73 Début laiteux
- 74 —
- 75 Mi-laiteux
- 76 —
- 77 Fin laiteux
- 78 —
- 79 —

8 STADE PÂTEUX

- 80 —
- 81 —
- 82 —
- 83 Début pâteux
- 84 —
- 85 Pâteux mou (la marque de l'ongle ne tient pas)
- 86 —
- 87 Pâteux dur (la marque de l'ongle persiste)
- 88 —
- 89 —

9 MATURATION

- 90 —
- 91 Grain dur, difficile à couper à l'ongle
- 92 Grain dur, ne peut être entamé pour l'ongle
- 93 —
- 94 Grain surmature, paille morte, entrenœuds ratatinés
- 95 Graines dormantes
- 96 Graines viables germant à 50%
- 97 Graines viables non dormantes
- 98 —
- 99 Graine prête à planter



Les suggestions de modifications à apporter à la publication 100A doivent être envoyées au directeur de la Section des grandes cultures de la province afin qu'elles puissent être transmises aux comités de grandes cultures appropriés au plus tard le 1^{er} avril 1990.